


# Zdravotnické úřady USA přiznaly, že po covidových vakcínách vzrostly onemocnění srdce 133násobně

[badatel.net/zdravotnicke-urady-usa-priznali-ze-po-covidovych-vakcinach-vzrastli-ochorenia-srdca-133-nasobne](https://badatel.net/zdravotnicke-urady-usa-priznali-ze-po-covidovych-vakcinach-vzrastli-ochorenia-srdca-133-nasobne)

redakce

22. júna 2023



(Ethan Huff, [Natural News](#) ) Dva hlavní úřady veřejného zdravotnictví ve Spojených státech amerických provedly společnou studii, která ukázala šokující nárůst rizika vzniku autoimunitního srdečního onemocnění u „plně očkovaných“ proti Covid-19.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zjistili, že v porovnání se základním rizikem v běžné populaci je riziko myokarditidy 133násobně vyšší u těch, kteří obdrželi mRNA „vakcíny“ od obou hlavních výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna.

Ke studii publikované v časopise *Journal of the American Medical Association* (JAMA) přispěli výzkumníci z několika špičkových univerzit a nemocnic z celé Ameriky.

Pomocí údajů z vládního systému hlášení nežádoucích událostí vakcín (VAERS) dokázaly CDC a FDA identifikovat 1 626 případů myokarditidy, které byly křížově zkontrolovány, aby se zajistilo, že výsledky jsou v souladu s oficiální definicí myokarditidy CDC.

Na základě toho výzkumníci dospěli k závěru, že nejrizikovější mRNA „vakcínou“ z hlediska potenciálních negativních účinků na zdraví je ta od Pfizer/BioNTech.

Vakcíny od Pfizeru podle údajů ze systému VAERS způsobily 105,9 případů myokarditidy na milion dávek po druhé injekci u mužů ve věku 16 a 17 let. Ve věkové skupině 12-15 let u mužů bylo po druhé dávce 70,7 případů myokarditidy na milion dávek.

Mužská věková skupina 18-24 let měla riziko 52,4 případů na milion podaných vakcín od Pfizeru a 56,3 případů na milion podaných vakcín od společnosti Moderna. Medián času od očkování do nástupu symptomů byl jen dva dny pro obě vakcíny

(Související: Jiná studie z Jižní Koreje zjistila, že případy myokarditidy mezi plně proočkovánými nadále raketově rostou.)

**Jelikož systém VAERS zachycuje jen přibližně 1% poškození vakcínou, jaké je skutečné riziko autoimunitního onemocnění srdce po covidovém očkování?**

---

Jak zjistily předchozí studie, naprostá většina srdečních problémů souvisejících s covidovým očkováním, přibližně 82%, se vyskytuje u mužů.

Ve velké většině případů, kolem 96%, museli být ti, kteří dostali myokarditidu, hospitalizováni a ve většině případů byli léčeni nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).



V době propuštění zaznamenalo 87% hospitalizovaných vymizení symptomů, tedy alespoň zpočátku. Nelze však říci, čím mohou tito lidé trpět v průběhu následujících let, zejména ve vyšším věku.

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patří:

- bolest na hrudi, tlak nebo nepohodlí (89%)
- dušnost (30%)
- abnormální výsledky na EKG (72%)
- abnormální srdeční nálezy na magnetické rezonanci (72%)

Úřad CDC si uvědomuje silnou a nepopiratelnou souvislost mezi covidovým očkováním a onemocněními srdce, proto spustilo program aktivního screeningu pro dospívající a mladé dospělé, aby sledovali vývoj jejich zdravotního stavu po příhodách po očkování souvisejících se srdcem.

Jelikož covidové vakcíny jsou k dispozici pouze od konce prosince 2020 a do těl lidí se reálně začaly dostávat až v roce 2021, stále nejsou k dispozici žádná dlouhodobá data k vyhodnocení dlouhodobého vlivu očkování na onemocnění srdce.

Organizace *American Heart Association (AHA)* a *American College of Cardiology (ACC)* radí, aby se lidé s myokarditidou zdrželi intenzivního sportu na 3 až 6 měsíců, jinak by mohli náhle zemřít na hřišti.

Teprve poté, kdy bude mít normální výsledky na EKG a jiných testech, by měl člověk postižený onemocněním srdce souvisejícím s covidovým očkováním být jen pomyslet na obnovení namáhavého cvičení.

## Závěr

---

Mimochodem, VAERS zachycuje jen 1% všech poškození zdraví a úmrtí souvisejících s očkováním. Takže jakkoli jsou tato čísla a procenta šokující, je třeba je vynásobit číslem 100, abychom získali přesnější obraz o skutečném počtu poškození zdraví a úmrtí z těchto „vakcín“.

Chcete držet krok s nejnovějšími zprávami o následcích očkování proti covidu? Můžete tak učinit na stránce [ChemicalViolence.com](https://www.chemicalviolence.com).



Autor: Ethan Huff, Zdroj: [naturalnews.com](https://www.naturalnews.com), Zpracoval: Badatel.net

## Související články

---

- [Zdravý 16letý chlapec po druhé dávce Pfizeru zemřel během online vyučování](#)
- [Švédsko na neurčito zakázalo vakcínu Moderna kvůli zmrzačujícím poškozením srdce](#)
- [Covidové vakcíny již poškodily a zabily více teenagerů než všechny jiné vakcíny dohromady.](#)

- Dospívající děti trpí poškozením srdce i měsíce po druhé dávce Pfizeru