


Další nová recenzovaná studie požaduje okamžité globální moratorium na takzvané vakcíny proti COVID-1

 necenzurovanapravda.cz/2024/11/dalsi-nova-recenzovana-studie-pozaduje-okamzite-globalni-moratorium-na-takzvane-vakciny-proti-covid-1

8 listopadu, 2024

I přes rostoucí počet studií, které potvrzují, že mRNA injekce jsou vše, jen ne účinné a bezpečné, se stále ve většině zemí propagují a doporučují těm skupinám, kterých je zřejmě zapotřebí se zbavit.

Jak jinak si vysvětlit neustálou ignoraci všech stávajících studií, které předkládají jasná fakta? Takzvané mRNA vakcíny jsou nebezpečné a mají bezpočet závažných vedlejších účinků, často se projevujících až s větším časovým odstupem.

O tom, jak riziková je aplikace těchto látek, svědčí i další recenzovaná studie, která porovnávala dopady mRNA Covid vakcín, vakcín proti chřipce a všech ostatních vakcín.

Studie odhaluje alarmující překročení prahu bezpečnostního signálu pro cerebrální trombózu – výzvy ke stažení z trhu jsou stále hlasitější.

Studie Rogerse et al s názvem **COVID-19 Vaccines: A Risk Factor for Cerebral Thrombotic Syndromes** byla právě zveřejněna po úspěšném odborném hodnocení v *International Journal of Innovative Research in Medical Science*.



COVID-19 Vaccines: A Risk Factor for Cerebral Thrombotic Syndromes

Claire Rogers ^{*1}, James A Thorp ², Kirstin Cosgrove ³, Peter A McCullough ⁴

¹Independent Researcher, Rome GA.

²The Wellness Company, Boca Raton FL.

³Independent Researcher, Stanley NC.

⁴McCullough Foundation, Dallas TX.

Table 3: The proportional risk ratios (PRR) of COVID-19 vaccines versus influenza vaccines (Column 2) and COVID-19 vaccines versus all other vaccines (Column 3) for each category CVT, CTU, CAT, CTE (by rows). There is a significant increase in cerebrovascular thrombosis for all categories ($p < 0.0001$).

Category of Thrombosis	COVID-19 Vaccines over 36 Months vs Influenza Vaccines over 408 Months PRR (95% Confidence Interval)	COVID-19 Vaccines over 36 Months vs Other Vaccines over 408 Months PRR (95% Confidence Interval)
Cerebral Venous Thrombosis (CVT)	2070 (955 - 4490) $P < 0.0001$	272 (177 - 416) $P < 0.0001$
Cerebral Thrombosis Undetermined (CTU)	943 (598 - 1480) $P < 0.0001$	187 (129 - 270) $P < 0.0001$
Cerebral Arterial Thrombosis (CAT)	1120 (152 - 8280) $P < 0.0001$	281 (97.6 - 806) $P < 0.0001$
Cerebral Thrombosis Total (CTE)	1120 (723 - 1730) $P < 0.0001$	207 (144 - 296) $P < 0.0001$


Table 3 demonstrates the proportional risk ratios (95% CI, p value) of COVID-19 vaccines versus Influenza vaccines (Column 2) and COVID-19 vaccines versus all other vaccines (Column 3) for each category CVT, CTU, CAT, CTE (by rows). There is a significant increase in cerebrovascular thrombosis for all categories ($p < 0.0001$).

Metodologie použitá pro tuto studii je následující:

Data byla shromážděna z databáze Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Food and Drug Administration (FDA) za období od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2023. Události mozkového tromboembolismu (CTE) po očkování proti COVID-19 byly porovnány s událostmi po očkování proti chřipce a všech ostatních očkováních pomocí analýzy proporcionálního poměru hlášení (PRR) na základě času.

Bylo zjištěno, že mozkové sraženiny (cerebrální tromboembolie) jsou o 112 000 % častější po očkování proti COVID-19 než po očkování proti chřipce. Ve srovnání se všemi ostatními vakcínami dohromady je riziko po očkování proti COVID-19 o 20 700 % vyšší.

Za pouhé 3 roky (36 měsíců) bylo po očkování proti COVID-19 hlášeno 5 137 případů mozkové tromboembolie, zatímco za posledních 34 let (408 měsíců) bylo u vakcín proti chřipce zaznamenáno pouze 52 případů. Pro ilustraci tohoto jasného bezpečnostního signálu byla vytvořena následující grafika:



V souladu s tím autoři dospěli k závěru:

Dochází k alarmujícímu překročení prahu bezpečnostního signálu pro nežádoucí účinky, jako je mozková trombóza po očkování proti COVID-19, ve srovnání s vakcínami proti chřipce a dokonce i všemi ostatními vakcínami.

Je nutné okamžité celosvětové moratorium na používání vakcín proti COVID-19, zejména s absolutní kontraindikací pro ženy v plodném věku.

Jejich volání po globálním moratoriu odráží obsáhlou studii Meada et al a mnoha dalších:

Administrativa Trump-RFK musí zakázat tyto katastrofální injekce od prvního dne v úřadu. Dokud tyto produkty nebudou odstraněny z trhu, můžeme očekávat, že počet závažných vedlejších účinků nadále poroste.

Ohodnoťte tento příspěvek!

■■■[Celkem: 9 Průměrně: 5]