

# Opičí neštovice: rady veřejného zdraví pro gaye, bisexuály a další muže, kteří mají sex s muži

[who.int/news/item/25-05-2022-monkeypox--public-health-advice-for-gay--bisexual-and-other-men-who-have-sex-with-men](https://www.who.int/news/item/25-05-2022-monkeypox--public-health-advice-for-gay--bisexual-and-other-men-who-have-sex-with-men)

25. května 2022

Oddělení novinky

Doba čtení: 2 minuty (409 slov)

Propuknutí nemoci zvané opičí neštovice v současné době probíhá v mnoha zemích, které obvykle nemají případy. To může být znepokojivé, zejména pro lidi, jejichž blízcí nebo komunita byli postiženi. Některé případy byly identifikovány prostřednictvím klinik sexuálního zdraví v komunitách gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži. Je důležité si uvědomit, že riziko opičích neštovic není omezeno na muže, kteří mají sex s muži. Každý, kdo má blízký kontakt s někým, kdo je infekční, je ohrožen. Vzhledem k tomu, že virus je v těchto komunitách identifikován, poznání o opičích neštovicích pomůže zajistit, aby bylo zasaženo co nejméně lidí a aby bylo možné epidemii zastavit.

Tato **rada veřejného zdraví** obsahuje informace o tom, jak se šíří opičí neštovice, co dělat, pokud si myslíte, že máte příznaky a jak chránit sebe a ostatní. Mohou jej používat komunitní vůdci, influenceri, zdravotníci a lidé účastníci se společenských akcí a večírků k informování a zapojení komunit mužů, kteří mají sex s muži.

## Co potřebuješ vědět

V některých zemích, kde se virus obvykle nevyskytuje, dochází k propuknutí nemoci zvané opičí neštovice. Některé z těchto případů se nacházejí v komunitách gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří

mají sex s muži. Transgender lidé a genderově různorodí lidé mohou být v kontextu současné epidemie také zranitelnější.

### **Příznaky zahrnují:**

- Vyrážka s puchýři na obličeji, rukou, nohou, očích, ústech a/nebo genitáliích
- Horečka
- Zduřené lymfatické uzliny
- Bolesti hlavy
- Bolest svalů
- Low energy

You can catch monkeypox if you have close physical contact with someone who is showing symptoms. This includes touching and being face-to-face.

Monkeypox can spread during close skin-to-skin contact during sex, including kissing, touching, oral and penetrative sex with someone who has symptoms. Avoid having close contact with anyone who has symptoms.

### **Protect yourself and others by:**

- Isolating at home and talking to a health worker if you have symptoms
- Avoid skin-to-skin or face-to-face contact, including sexual contact with anyone who has symptoms
- Clean hands, objects, and surfaces that have been touched regularly
- Wear a mask if you are in close contact with someone with symptoms

**Stigmatising people because of a disease is never ok. Anyone can get or pass on monkeypox, regardless of their sexuality.**

**Pro více informací si prosím přečtěte celý dokument:**

[Opičí neštovice: rady veřejného zdraví pro gaye, bisexuály a další muže, kteří mají sex s muži](#)

[Přihlaste se k odběru našich newsletterů →](#)

Příbuzný

Stažení

---

[Opičí neštovice: rady veřejného zdraví pro gaye, bisexuály a další muže, kteří mají sex s muži](#)

Opičí neštovice

---

[Téma zdraví](#)

[Otázky a odpovědi](#)

Více informací

---

[Muži, kteří mají sex s muži](#)

Více

**LIVE Q&A o opičích neštovicích**

---



Watch Video At: <https://youtu.be/Wx7YEWGGMj8>

© 2022

SZO