

# **Renomovaný kardiolog: Takzvané Covid vakcíny způsobily téměř 112 000% nárůst mozkových sraženin ve srovnání s očkováním proti chřipce**

---

 necenzurovanapravda.cz/2024/08/renomovany-kardiolog-takzvane-covid-vakciny-zpusobily-temer-112-000-narust-mozkovych-srazenin-ve-srovnani-s-ockovanim-proti-chripce

26 srpna, 2024

Krevní sraženiny jsou velmi dobře známým vedlejším účinkem genových injekcí. Hlášeny jsou také podivné sraženiny v tělech zespulých, které se ve větší míře začaly objevovat až v posledních třech letech. Právě krevním sraženinám se věnovala studie, která tu svouvislost potvrdila.

Jeden z předních světových kardiologů bije na poplach kvůli velké studii, která identifikovala nárůst mozkových sraženin u pacientů očkovaných proti Covidu.

Americký kardiolog Dr. Peter McCullough odhalil šokující data ukazující, že injekce mRNA proti Covidu způsobily ohromující **112 000% nárůst mozkových sraženin.**

Nově publikovaná studie týmu odborníků vedená McCulloughem analyzovala všechny zprávy o mozkové tromboembolii za posledních 34 let.

Podle Johns Hopkins Medicine dochází k mozkové tromboembolii, když se v mozkových žilních dutinách vytvoří krevní sraženina.

To zabráňuje odtoku krve z mozku.

Tento řetězec událostí je součástí mrtvice, která může poškodit mozek a centrální nervový systém a způsobit náhlou smrt.

Je to známý vedlejší účinek injekcí mRNA proti Covidu.

Studie doktorů McCullougha, Kirstin Cosgrove, Jamese Thorpa a Claire Rogersové zkoumala údaje o hlášeních o mozkové tromboembolii po očkování Covidem, které byly předloženy

americkému Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a federálnímu systému hlášení nežádoucích příhod z vakcín (VAERS).

**Analyzovali všechny zprávy od ledna 1990 do prosince 2023.**

Studie zjistila 5 137 případů hlášených během tří let, kdy byly k dispozici injekce mRNA proti Covidu.

Za celých 34 let údajů však bylo hlášeno pouze 52 případů mozkové tromboembolie spojené s vakcínami proti chřipce.

Podle těchto údajů došlo k 1120násobnému nárůstu mozkové tromboembolie u injekcí proti Covidu ve srovnání s očkováním proti chřipce.

**To znamená nárůst o neuvěřitelných 111 795 %.**

U všech ostatních vakcín, kromě očkování proti chřipce, bylo za posledních 34 let hlášeno 282 hlášení mozkové tromboembolie spojené s vakcínami.

Díky tomu je riziko z nových očkování 207krát vyšší ve srovnání s jinými vakcínami, neboli **nárůst o 20 600 %.**

Ve srovnání se všemi ostatními vakcínami dohromady způsobilo očkování Covidem **17 334% nárůst mozkové tromboembolie za daný čas.**

„Dochází k alarmujícímu překročení prahu bezpečnostního signálu týkajícího se AEs [nežádoucí účinky] mozkové trombózy po vakcínách COVID-19 ve srovnání s vakcínami proti chřipce a dokonce i ve srovnání se všemi ostatními vakcínami,“ uzavírají autoři.

**„Okamžité celosvětové moratorium na používání vakcín proti COVID-19 je nezbytné s absolutní kontraindikací u žen v reprodukčním věku.“**

McCullough, široce publikovaný kardiolog, na svém osobním Substacku dodal, že zpráva nezachycuje úroveň trvalé neurologické devastace a invalidity, kterou tito pacienti trpí.

„Mohu vám říci, že jejich množství musí být velmi vysoké vzhledem k rozsáhlé povaze hlášených krevních sraženin,“ vysvětluje.

„Tato data mimo jiné silně podporují odstranění všech vakcín a boosterů COVID-19 z trhu. Nikdo by neměl být vystaven riziku vážné mrtvice žádnou vakcínou.“

Velké množství důkazů spojuje injekce mRNA proti Covidu s několika smrtelnými nemocemi a náhlými úmrtími.

Mezi nimi VAERS hlásí 37 647 úmrtí, 216 757 hospitalizací, 21 741 srdečních infarktů a 28 445 případů myokarditidy a perikarditidy k 31. květnu.

Vědci CDC rozpoznali vysokou míru ověření hlášení myokarditidy u VAERS po očkování COVID-19 na bázi mRNA.

To vedlo k závěru, že „podhodnocené vykazování je pravděpodobnější“ než nadměrné vykazování.

Jak již dříve uvedl Slay News, v únoru byla v prestižním recenzovaném časopise *Vaccine* zveřejněna rozsáhlá analýza 99 milionů lidí v osmi zemích.

Studie, dosud největší analýza, pozorovala výrazně vyšší rizika myokarditidy po první, druhé a třetí dávce injekcí proti Covidu na bázi mRNA.

Vědci také varovali před zvýšeným rizikem perikarditidy, Guillain-Barrého syndromu a trombózy mozkových žilních dutin a dalších potenciálních bezpečnostních signálů, které vyžadují další vyšetření.

V dubnu bylo CDC nuceno vydat soudním příkazem 780 000 dosud nezveřejněných zpráv o závažných nežádoucích účincích.

Mezitím studie od elitních vědců v Japonsku zjistila statisticky významný nárůst úmrtí na rakovinu po třetích dávkách injekcí COVID-19 na bázi mRNA a nabídla několik teorií pro příčinnou souvislost.

Velká porota na Floridě podporovaná republikánským guvernérem Ronem DeSantisem v současné době vyšetřuje výrobu a zavedení injekcí proti Covidu.

V únoru panel zveřejnil svou první průběžnou zprávu o základním odůvodnění programu hromadného očkování.

Zpráva zjistila, že lockdowny způsobily více škody než užitku, že roušky byly neúčinné při zastavení přenosu Covidu, a že virus byl statisticky téměř neškodný pro děti a většinu dospělých.

Panel také varoval, že je velmi pravděpodobné, že počty pacientů s Covidem a úmrtí v nemocnicích byly nafouknuté, aby zvýšily obavy a podpořily „vakcíny.“

Zpráva hlavní poroty o samotných injekcích se již brzy očekává.

Generální prokurátor Kansasu Kris Kobach oznámil žalobu proti farmaceutickému gigantu Pfizer kvůli zavádějícím prohlášením o zdravotních rizicích a neúčinnosti jeho injekcí mRNA proti Covidu.

Kobach viní farmaceutického giganta z porušení kansaského zákona o ochraně spotřebitele.

Ohodnoťte tento příspěvek!

 [Celkem: 5 Průměrně: 5]